

Květena České republiky



© Jan ŠEVČÍK

Další fotografie k prezentovaným druhům
a další informace
naleznete na stránkách

<http://flora.upol.cz/>

**Portál České Flóry
– edukační moduly pro výuku botaniky**

CZ.1.07/2.2.00/15.0269



Endemity květeny ČR



Pinguicula bohemica

příbuzné taxony:

P. vulgaris, *P. vulgaris* var. *bicolor*



Dactylorhiza bohemica

Příbuzné taxony:

D. traunsteineri, D. curvifolia



Dactylorhiza carpatica

Příbuzné taxony: *D. traunsteineri* agg.



Cerastium alsinifolium

příbuzné taxony: *C. alpinum* agg.



Minuartia smejkalii

příbuzné taxony: *M. caespitosa*, *M. gerardii*, *M. glauicina*, *M. corcontica*



Minuartia corcontica

Dianthus arenarius subsp. *bohemicus*



Dianthus moravicus

příbuzný taxon: *D. gratianopolitanus*



Dianthus carthusianorum* subsp. *sudeticus

příbuzné taxony: subsp. *capillifrons*, subsp.
carthusianorum

© Jan ŠEVČÍK

Potentilla lindackeri

příbuzné taxony: *P. collina* agg.,
P. argentea, *P. tabernaemontani*



Potentilla psammophila



Saxifraga rosacea* subsp. *steinmannii

příbuzný taxon: subsp. *sponhemica*

Scilla bifolia* subsp. *rara

příbuzné taxony: subsp. *bifolia*, subsp. *buekvensis*, subsp. *spetana*, *S. vindobonensis*



11



Carlina biebersteinii* subsp. *sudetica

příbuzné taxony: subsp. *biebersteinii*, *C. vulgaris*

Gentianella praecox* subsp. *bohemica

příbuzné taxony: subsp. *praecox* (= *G. gabretiae*),
G. austriaca, *G. lutescens*



Aconitum plicatum* (= *A. callibotryon*): subsp. *plicatum*, subsp. *sudeticum


příbuzné taxony: *A. napellus*, *A. formosum*, *A. firmum*

Knautia arvensis* subsp. *pseudolongifolia

příbuzné taxony: subsp. *pannonica*,
subsp. *serpentinicola*



© Michal Hroneš



© Michal Hroneš

Pedicularis sudetica* subsp. *sudetica



***Carex derelicta* (= *C. viridula* subsp. *pseudoscandinavica* nom. nud.)**

příbuzné taxony: *C. viridula* s. str.,
C. scandinavica

Euphrasia corcontica

příbuzné taxony: *E. minima*, *E. micrantha*, *E. tatrae*


Galium sudeticum

příbuzné taxony: *G. anisophyllum*, *G. pumilum*,
G. valdepilosum



Poa riphaea

příbuzné taxony: *P. glauca*, *P. marginicola*,
P. sejuncta



Campanula rotundifolia* subsp. *sudetica

příbuzné taxony: subsp. *rotundifolia*, *C. tatrae*

Campanula bohemica

příbuzné taxony: *C. scheuchzeri*,
C. gelida

© Michal Hroneš



Campanula gelida



Plantago atrata subsp. *sudetica*

příbuzné taxony: subsp. *atrata*,
subsp. *carpatica*



Cortusa matthioli* subsp. *moravica

Oenothera moravica

(*Oe. fallax* x *Oe. victorini*)

Primula elatior* subsp. *corcontica

Rod ***Taraxacum*:**

T. alpestre, *T. indigenum*



Rod *Alchemilla*:

A. obtusa subsp. *trapezialis*
(*A.corcontica*)



Rubus bohemiicola

Rod *Rubus*:

R. bohemiicola
R. vratnensis
R. brdensis
R. centrobohemicus
R. josholubii (?)



Rubus vratnensis

Sorbus sudetica

(*S. aria-chamaespirus*)



© Michal Hroneš



© Michal Hroneš

Sorbus bohemica (*S. danubialis-torminalis*) agg.:
S. bohemica, *S. portae-bohemicae*, *S. albensis*
S. milensis
S. eximia (*S. aria-torminalis*), *S. barrandienica*
S. alnifrons (*S. danubialis-torminalis*)
S. rhodanthera (*S. danubialis-torminalis*)
S. gemella (*S. danubialis-torminalis*)
S. omissa
? *S. quernea* (*S. aria-torminalis*)



Sorbus albensis



Sorbus milensis



Sorbus gemella

Rod *Hieracium*

Subg. *Hieracium*

Základní druhy v ČR: *H. alpinum*, *H. bifidum*, *H. lachenalii*, *H. laevigatum*, *H. murorum*, *H. prenanthoides*, *H. racemosum*, *H. sabaudum*, *H. schmidtii*, *H. umbellatum*, *H. villosum* (žádný z nich není endemit ČR)

Endemické taxonomy v ČR:

H. schmidtii subsp. *winkleri*

Střední až severní Čechy

H. schmidtii subsp. *diversifolium*

České středohoří, ? Tyrolsko

H. melanocephalum (*H. alpinum* agg.)

Krkonoše

H. tubulosum (*H. alpinum* agg.)

Krkonoše, ? Jizerské hory (dříve)

H. schustleri (*H. alpinum* agg.)

Krkonoše, Králický Sněžník

Subg. *Hieracium* – endemické druhy v ČR

H. nigrescens (*H. alpinum* \geq *H. murorum*)

Krkonoše

H. decipiens (*H. alpinum* \geq *H. murorum*)

Krkonoše, ? Karpaty

H. chrysostyloides (*H. alpinum* \geq *H. murorum*)

Hrubý Jeseník, Králický Sněžník

H. nivimontis (*H. alpinum* \geq *H. murorum*)

Králický Sněžník

H. apiculatum (*H. alpinum* \geq *H. murorum*)

Krkonoše

H. glandulosodentatum (*H. lachenalii* – *H. nigrescens* (tj.: *H. alpinum* \geq *H. murorum*))

Krkonoše

Subg. *Hieracium* – endemické druhy v ČR

H. fritzei (*H. alpinum* > *H. prenanthoides*)

Krkonoše

H. uechtritzianum (*H. alpinum* > *H. prenanthoides*)

Krkonoše, Králický Sněžník

H. schneiderianum (*H. alpinum* > *H. prenanthoides*)

Krkonoše

H. rohlenae (*H. alpinum* > *H. prenanthoides*)

Krkonoše

H. nigrostylum (*H. alpinum* > *H. prenanthoides*)

Krkonoše

H. pseudalbinum (*H. murorum* ≤ *H. prenanthoides*)

Krkonoše

H. albinum (*H. murorum* > *H. prenanthoides*)

Krkonoše

H. pedunculare (*H. alpinum* – *H. prenanthoides*)

Krkonoše; kdysi na polské straně Jizerských hor

H. riphaeum (*H. alpinum* < *H. prenanthoides*)

Krkonoše



Hieracium albinum

Subg. *Hieracium* – endemické druhy v ČR

H. corconticum (*H. nigrescens* (tj.: *H. alpinum* \geq *H. murorum*) < *H. prenanthoides*)
Krkonoše (i polská strana)

H. asperulum (*H. nigrescens* (tj.: *H. alpinum* \geq *H. murorum*) < *H. prenanthoides*)
Krkonoše

H. chlorocephalum (*H. alpinum* – *H. lachenalii* – *H. prenanthoides*)
Krkonoše, Hrubý Jeseník; kdysi polská strana Jizerských hor (příbuzné typy
v Alpách i Karpatech)

H. purkynei (*H. epimedium* (tj.: *H. bifidum* – *juranum* (tj. *H. murorum* \leq *prenanthoides*) – *H. atratum* (tj. *H. alpinum* < *murorum*))
Krkonoše (vyhynulý)

H. chamaedenum (*H. racemosum* – *H. schmidii*)
Znojemsko, údolí Dyje u obce Konice (zatopeno přehradou)

Hieracium subg. Pilosella

Základní druhy v ČR: *H. aurantiacum*, *H. bauhini*, *H. caespitosum*, *H. cymosum*, *H. echioides*, *H. lactucella*, *H. macranthum*, *H. onegense*, *H. pilosella*, *H. piloselloides* (žádný z nich není endemit ČR)

Endemické taxonomy v ČR:

H. callimorphoides (*H. longiscapum* < *H. pilosella*)


Severní Čechy (okolí Kadaně a České Lípy); nezvěstný

H. tephrophyton (*H. bifurcum* (tj. *H. echioides* ≤ *H. pilosella*) – *H. lactucella*)

Kraví hora u Znojma; nezvěstný

H. pseudocalodon (*H. calodon* (tj. *H. echioides* – *H. piloselloides*) – *H. fallax* (tj. *H. cymosum* – *H. echioides*))

Podkrušnohoří (Bohosudov); nezvěstný



Literatura: Kaplan Z. (2012): Flora and phytogeography of the Czech Republic. – Preslia 84: 505–573.

